
Состав и форма выпуска

Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций.

1 ампула с лиофилизированным порошком содержит цитидина-5-моно фосфата динатриевой соли 10 мг, уридина-5-три фосфата три натриевой соли, уридина-5-дифосфата динатриевой соли, уридина-5-моно фосфата динатриевой соли всего 6 мг (соответствует 2,660 мг чистого уридина).

Вспомогательные вещества: маннитол.

Растворитель: вода, натрия хлорид.

Фармакологические свойства

Нуклео ЦМФ Форте обеспечивает фосфатные группы, необходимые для объединения моносахаридов с церамидами для образования цереброзидов и фосфатидных кислот, которые составляют основу сфингомиелина таглицерофосфолипидов. Сфингомиелин и глицерофосфолипиды являются основными компонентами миелиновой оболочки. Таким образом, Нуклео ЦМФ Форте проявляет трофические свойства и способствует регенерации аксонов нервной ткани.

Показания для применения

Лечение невралгий костно-суставного (радикулопатии: люмбаго, люмбалгия, люмбоишиалгия), метаболического (алкогольная, диабетическая полинейропатия), инфекционного происхождения (опоясывающий лишай, ганглион), а также при воспалении тройничного нерва, лицевого нерва, при межреберной невралгии, плекситах.

Способ применения и дозы

Нуклео ЦМФ Форте инъекции для внутримышечного введение. Перед введением необходимо растворитель перенести в ампулу с лиофилизированным порошком. Взрослым, в том числе людям пожилого возраста, и подросткам от 14 лет назначают Нуклео ЦМФ Форте в дозе 1 инъекция 1 раз в сутки.

Детям от 2 до 14 лет Нуклео ЦМФ Форте рекомендуется в дозе 1 инъекция каждые двое суток.

Рекомендуемый курс лечения: препарат назначают в виде одной инъекции в сутки на протяжении 3 или 6 сут, далее продолжают прием по 1-2 капсулы дважды в сутки в

течение 10 суток. При необходимости прием может быть продолжен на 20 суток, если это назначено по медицинским показаниям.

Побочное действие

Не было описано.

Противопоказания

Известные аллергические реакции на отдельные компоненты препарата, детский возраст до 2 лет.

Передозировка

Учитывая низкую токсичность препарата, вероятность отравления низкая даже при случайном превышении терапевтической дозы.

Особенности применения

Применение в период беременности и лактации. Применение препарата в период беременности и лактации не противопоказано, но целесообразность приема устанавливается в зависимости от преобладания пользы над потенциальным риском от применения.

Влияние на способность управлять транспортными средствами. Нуклео ЦМФ Форте не влияет на способность управлять транспортными средствами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не установлено.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при комнатной температуре (не выше 30° С).

Срок годности

2 года.

Условия продажи

По рецепту.